

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Publication périodique de la Circonscription PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, CORSE  
DLP 19-8-83219793

- MINISTERE DE L'AGRICULTURE -

- SERVICE de la PROTECTION des VEGETAUX -

STATION D'AVERTISSEMENTS : Ancienne Conserverie de CASAMOZZA, LUCCIANA 20290 - BORGO

Abonnement annuel : 65 Fr. à Régisseur recettes D.D.A. VAUCLUSE - MARSEILLE 9660 74 V

## Edition Speciale Corse

BULLETIN N° 15

DU 11 AOUT 1983.



V I G N E

=====

### . Mildiou

Nous rappelons l'intérêt d'une application d'un produit à base de cuivre, en début de véraison.

### . Tordeuses de la grappe


Les vols enregistrés dans nos postes de piégeage sont particulièrement faibles pour cette troisième génération. Les captures de papillons sont nulles ou très faibles à PATRIMONIO, SAINT FLORENT, dans le CAP, en BALAGNE, à PORTO-VECCHIO et sur la Côte Orientale jusqu'à ALERIA et MAISON PIERAGGI. Aucune intervention n'est à réaliser pour le moment.

Par contre, au Sud d'AGHIONE et à GHISONACCIA, le vol a débuté entre le 29 Juillet et le 4 Août. Dans ces secteurs, une intervention préventive pourra être réalisée sur les chenilles à l'éclosion, à partir du 18 Août, dans les parcelles déjà attaquées par la 2ème génération ou sensibles au Botrytis.

### . Cicadelles vertes

Elles sont nombreuses dans certaines parcelles à ALERIA et GHISONACCIA. Intervenir si on dénombre 100 larves pour 100 feuilles avec les produits conseillés dans le bulletin N° 13.

### Cycle biologique



## AGRUMES

De fortes populations d'acariens sont actuellement présentes dans les vergers. On trouve à la fois des oeufs, des larves et des adultes. Des pucerons sont également visibles sur les jeunes pousses. Des vols d'Aleurodes se manifestent.

On observe aussi des éclosions de larves de cochenilles.



*Saissetia oleae*  
(Cochenille noire  
de l'Olivier)

Carapace brun noir  
Oeufs rose clair  
Taille : 5 mm



Carapace claire cireuse,  
rose à grisâtre violacée  
Taille : 5 mm

*Céroplast sinensis*  
(Cochenille chinoise)

Attendre la semaine du 22 au 27 Août pour effectuer un traitement insecticide généralisé. S'il y a pullulation d'Aleurodes, retarder encore d'une semaine. La végétation sera suffisamment mouillée : 2000 à 2500 l/ha minimum, pour un verger adulte.

En présence de Cochenilles, Aleurodes et Pucerons, utiliser :

Parathion (N. S.)

ou

Méthomyl

(Lannate)

ou Méthidathion (Ultracide 20)

S'il y a aussi des acariens, préférer l'Omethoate (Folimat). L'efficacité insecticide du produit sera renforcée par l'adjonction de 1 % d'huile blanche d'été dans la bouillie.

## OLIVIER

### . Mouche de l'olive

Les captures enregistrées dans nos pièges sont en augmentation. La 2ème génération est en train de débiter. Le traitement préventif par appât - pulvérisation est à réaliser à partir du 15 Août. Pour le traitement insecticide curatif, se reporter au prochain bulletin.